แนวปฏิบัติเมื่อเกิดผลไม่พึงประสงค์จากการฉีดยาชาเฉพาะที่ โรงพยาบาลทันตกรรม

ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดยาชาเฉพาะที่

ประเมินการรับรู้สติ

หมดสติ ไม่รู้สึกตัว

ดำเนินการตามแนวทางการจัดการผู้ป่วยเป็นลม หมดสติ

รู้สึกตัวดี

มีอาการเฉพาะที่
- ช่องปากหรือใบหน้าบริเวณที่ฉีดยาชาบวมเฉียบพลัน
- อ้าปากจำกัด
- ใบหน้าเป็นอัมพาตครึ่งซีกข้างเดียวที่ฉีดยาชา
- มีอาการทางตา เช่น ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน สูญเสียการมองเห็น
- เข็มฉีดยาชาหักคาเนื้อเยื่อ

ปรึกษาศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

- ในเวลาราชการ: อาจารย์ OPD คลินิกศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โทร. 7641

- นอกเวลาราชการ : ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่ปฏิบัติงานในคลินิกบริการนอกเวลาราชการ โทร.7625

มีอาการทางระบบร่างกาย

-ปวดศีรษะ
-ใจสั่น หัวใจเต้นแรงเร็ว

Epinephrine

มีผื่นแดงคัน ลมพิษ ใบหน้าหรือริมฝีปากบวม ร่วมกับอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง
- หายใจติดขัด หายใจมีเสียงวี๊ซ
- ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
- หัวใจเต้นเร็ว ความดันต่ำ

LA Allergy

- มึนศีรษะ ขมปาก หูอื้อ ชารอบปาก
- วุ่นวายสับสน พูดไม่ชัด กล้ามเนื้อกระตุก

Early signs of LA Toxicity

- เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับ ปวดร้าวไปที่แขนและหัวไหล่ซ้าย
- หน้ามืด เหงื่อแตก ใจสั่น คลื่นไส้อาเจียน

Ischemic

- ปวดมึนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
- แขนขา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง
- ใบหน้าเป็นอัมพาตครึ่งซีก

Stroke

- ตามอาจารย์แพทย์วิสัญญี โทร.7686 หรือ อาจารย์ OPD คลินิกศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โทร.7641เพื่อประเมินและให้การรักษาเบื้องต้น
- สังเกตอาการ
- ติดตามสัญญานชีพ

อาการไม่ดีขึ้น

โทร. 1669
ศูนย์นเรนทร