
# แนวปฏิบัติกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์นอกเวลาทำการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ **ช่วยเหลือ** | - ซักประวัติ<br>- ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น<br>- ปรับตำแหน่ง ผู้ป่วยให้เหมาะสม | - เตรียมอุปกรณ์ให้ออกซิเจน | - หัวหน้าคลินิกโทรแจ้งผู้จัดการคลินิกฯ | - เข็น O2 tank<br>- เครื่องวัดสัญญาณชีพ |
| ☐ **เครื่องวัดสัญญาณชีพ** | | - ให้ $O_2$ เมื่อ $O_2$ sat < 94% | - วัดสัญญาณชีพ<br>☐ BP<br>☐ O2 sat | - เตรียมรถนั่ง (Wheel chair) |
| ☐ **ทันตแพทย์เจ้าของไข้และผู้จัดการ** | - ประเมินอาการร่วมกัน กรณีอาการไม่ดีขึ้นจากการรักษาเบื้องต้น โทรปรึกษารองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล หรือ โทร 1709 เพื่อเรียกรถฉุกเฉินส่งER รพ.มอ. | | | |

**ทันตแพทย์เจ้าของไข้:** - ทันตแพทย์ที่มาลงปฏิบัติงาน
**ทันตแพทย์เจ้าของไข้/หัวหน้าคลินิก:** - รายงานอุบัติการณ์มายังสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม ในวันทำการ

** เครื่องAED ชั้น1 ที่หน้าคลินิกรวม1 ,คลินิก CCDD ,หน้าหอผู้ป่วย ,ห้องผ่าตัด ,คลินิกบริการ (หน้าหอประวัติ)
ชั้น2 ที่หน้าคลินิกรวม2
ชั้น3 ที่หน้าคลินิกรวม3 (คลินิกเด็ก),คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ **ก หน้าอก** | - กดลึก 1/3 ของหน้าอก สลับการช่วยหายใจ | - เตรียม Ambu bag with Mask<br>- ช่วยหายใจ | - แจ้ง ผจก.คลินิก<br>- โทรสายภายใน เรียกรถฉุกเฉิน รพ.มอ.1709<br>- โทรแจ้ง รปภ.เคลียร์พื้นที่ รพ.<br>- เอาเครื่อง AED** | - เดินไปแจ้ง รปภ. ให้เปิดประตูเหล็กม้วนทางลาด<br>- เข็น O2 tank<br>- เครื่องวัดสัญญาณชีพ |
| ☐ **สัดส่วนกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจ** | - กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับช่วยหายใจ 2 ครั้ง เปลี่ยนคนกดหน้าอกทุก 2 นาที สลับกับ ผู้ช่วยเหลือคนที่ 1 | | | |
| ☐ **AED +เครื่องวัดสัญญาณชีพ,O2** | - แจ้งเตือนห้ามสัมผัสผู้ป่วย<br>- ทำการช็อกหัวใจ<br>- กดหน้าอกทันที เมื่อ ช็อกเสร็จ | - เตรียมกดหน้าอกสลับช่วยหายใจ เมื่อพร้อม | - เปิดเครื่อง<br>- แปะแผ่น AED<br>- วัดสัญญาณชีพ + ต่อ $O_2$ กับ Ambu bag | |
| ☐ **ทีม CPR** | - ทันตแพทย์เจ้าของไข้ รายงานอาการ | | | |
| ☐ **รถกู้ชีพมาถึง** | - พร้อมส่งต่อโรงพยาบาล ม.อ. ทันตแพทย์เจ้าของไข้//เจ้าหน้าที่คลินิก ติดตามคนไข้ไป ER | | | |

**ทันตแพทย์เจ้าของไข้/หัวหน้าคลินิก:** รายงานอุบัติการณ์มายังสำนักงานในวันทำการ