แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุผู้ป่วยเด็ก
โรงพยาบาลทันตกรรม

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย.....HN.....

ปัจจัย	แนวทางปฏิบัติ
ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว, ผู้ป่วยเด็กพิเศษ	☐ แนะนำการดูแลกับผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 – การตรวจช่องปากและการตรวจภาพรังสี	
มีคราบจุลินทรีย์ที่ชัดเจน	ฝึกปฏิบัติการทำความสะอาดช่องปาก (แปรงฟัน,ไหมขัดฟัน) - วิธีแปรงฟันที่แนะนำ.....จำนวนครั้ง.....วัน **ไม่ให้เด็กบ้วนน้ำหลังแปรงฟัน** ☐ เด็กแปรงเอง ☐ ผู้ปกครองแปรงให้ ☐ เด็กแปรงแล้วผู้ปกครองแปรงซ้ำ - การใช้ไหมขัดฟัน ☐ เด็กทำเอง (ผู้ปกครองดูแล) ☐ ผู้ปกครองทำให้
Active white spot lesion	☐ จ่าย 0.05 % NaF MW (เด็กอายุ > 6 ปี)
ฟันผุในชั้นเคลือบฟันหรือลึกกว่าภาพรังสี	☐ Remineralization ด้วย..... ☐ Restoration
การเลือกใช้ Professional fluoride	☐ 1.23% APF gel ☐ 5% NaF varnish
มีความผิดปกติผิวฟันและหลุมร่องฟันลึกในฟันกรามแท้	☐ Resin sealant ☐ GI sealant
ส่วนที่ 3 – ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ	
ปริมาณยาสีฟันที่เลือกใช้	☐ พอเปียกแปรง ☐ ความกว้างของแปรง ☐ ความยาวของแปรง
ดูดนมรสหวานที่มีน้ำตาลจากขวดนม	ผู้ปกครองเลือกวิธี ☐ ใส่นมจืด ☐ ใส่น้ำ ☐ อื่น ๆ.....
ดูดนมกลางคืนหลังอายุ 12 เดือน	ผู้ปกครองเลือกวิธี ☐ กล่อมลูกให้หลับต่อ ☐ ดูดน้ำ ☐ อื่น ๆ.....
รับประทานอาหารว่าง/ขนม/เครื่องดื่ม ที่มีน้ำตาลระหว่างมื้อหลักมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน	☐ ทดแทนอาหารอื่นแทนอาหารที่มีน้ำตาล (ด้วยอะไร มื้อใด) ..... ☐ กินอาหารที่มีน้ำตาลในมื้ออาหาร (อาหารชนิดใด) ..... ☐ ลดความถี่ของอาหารที่มีน้ำตาล (จะลดอะไร มื้อใด) .....
ใส่เครื่องมือในช่องปาก	☐ จ่าย 0.05 % NaF MW (เด็กอายุ > 6 ปี)

ความร่วมมือของผู้ปกครองในการปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนตามความเป็นไปได้ของสภาวะแวดล้อมของครอบครัว

.....

ลงชื่อ...../.....

นักศึกษา/อาจารย์