

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
เรื่อง ผู้ป่วยกลืนน้ำยาอมบ้วนปาก 1% Povidone Iodine

หน่วยงาน หน่วยเภสัชกรรม และ คลินิกรวม 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 – 15.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1. | ภญ.พนิตา พร้อมมูล | หน่วยเภสัชกรรม |
| 2. | ภญ.กฤติยา ศรีสุวรรณวิเชียร | หน่วยเภสัชกรรม |
| 3. | นางนาตยา พาหุมนโต | หน่วยเภสัชกรรม |
| 4. | นายนิยม ชูชื่น | หน่วยเภสัชกรรม |
| 5. | นายศิริโชค เจริญกุล | หน่วยเภสัชกรรม |
| 6. | นางสมจิต พัชรวิรุพห์ | คลินิกรวม1 |
| 7. | น.ส.สุรัตน์ดา สุขมี | คลินิกรวม1 |
| 8. | น.ส.วรารินทร์ ขวัญโตะระ | คลินิกรวม1 |
| 9. | น.ส.วรรณชนก เลขานุกิจ | คลินิกรวม1 |
| 10. | นาง กานดา ณ พัทลุง | คลินิกรวม1 |
| 11. | น.ส.รัชนก หัสติน | คลินิกรวม1 |
| 12. | น.ส.จินดา แซ่จิว | คลินิกรวม1 |
| 13. | น.ส.อิงกมล สุวรรณกาญจน์ | คลินิกรวม1 |
| 14. | น.ส.กิตติยา อินทรपाल | คลินิกรวม1 |
| 15. | น.ส.สุธินี พุทธศุภร์ | คลินิกรวม1 |
| 16. | น.ส.ดาริกา ยี่รุ่งเรือง | คลินิกรวม1 |
| 17. | นางรอกีเยาะ ยื่อแร | คลินิกรวม1 |

เหตุการณ์/ปัญหา ที่พบนำมาทบทวน	วิเคราะห์สาเหตุ	เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	การปรับปรุงที่เกิดขึ้น การดำเนินการแก้ไขปรับปรุง/ผลการ ประเมิน	ผู้ร่วมทบทวน
<p>ผู้ป่วยชายไทยอายุ 12 ปี ได้มารับการตรวจคัดกรอง ถอนฟันซี่ 46 จุด OPD เมื่อเข้าตรวจ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ได้แจ้งคนไข้ให้อมน้ำยาบ้วนปาก povidone Iodine โดยไม่ได้แจ้งผู้ป่วยให้บ้วนทิ้ง ผู้ป่วยจึงกลืนยาเข้าไปปริมาณ 5 ml หลังจากกลืนยา จึงส่งพยาบาลสังเกตอาการและปฐมพยาบาลโดยการให้กลืนน้ำตามปริมาณ 600 ml และรับประทานขนมปัง 2 แผ่น และห้ามอาเจียน หลังจากนั้นผู้ป่วยมีอาการปกติ จึงทำการรักษาขั้นต่อไป และเจ้าหน้าที่โทรสอบถามอาการผู้ป่วยในวันถัดไป</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ช่วยทันตแพทย์สื่อสารไม่ครบถ้วน 2. ผู้ป่วยเด็ก 12 ปี การรับรู้ อาจไม่เข้าใจการอมประกอบกับรสชาติที่ใกล้เคียงยาน้ำเด็ก 3. น้องนักเรียนผู้ช่วยขาดการสื่อสาร และประสบการณ์ 4. รูปแบบการสื่อสารของสื่อ ยังเข้าถึงและเข้าใจได้ยากสำหรับผู้ป่วยเด็ก และขาดการสื่อสาร 2 ทาง 	<p>อุบัติการณ์การเกิด Administration error</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดแนวปฏิบัติการใช้ยาบ้วนปาก 2. กรณีเป็นนักเรียนผู้ช่วย กำหนดแนวทางการ orientation นักเรียนผู้ช่วยเพิ่มเติมด้านแนวทางการบริหารและอุบัติการณ์ที่ควรระมัดระวัง 3. กำหนดกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางการได้ยิน ชาวต่างชาติ โดยกำหนดปริมาณการอมบ้วน 15 ml ที่ชัดเจน 4. กำหนดแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดการกลืน โดย <ol style="list-style-type: none"> 4.1 แจ้งทันตแพทย์เจ้าของไข้ 4.2 ดูแลเรื่องอาการข้างเคียงและแจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการกลืนในปริมาณดังกล่าวไม่เป็นอันตราย 4.3 ไม่แนะนำให้อาเจียน โดยให้ดื่มน้ำตามมากๆ 4.4 ติดตามอาการหลังเกิดเหตุการณ์ 1 ชม. 4.5 โทรติดตามอาการหลังเกิดเหตุการณ์ 24 ชม. 1 ครั้ง 	<p>-เภสัชกร -ผู้ช่วยทันตแพทย์คลินิก รวม 1</p>